

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Septolete total lemon & elderflower 3 mg/1 mg pastile

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare pastilă conține clorhidrat de benzidamină 3 mg și clorură de cetilpiridiniu 1 mg.

Excipient cu efect cunoscut: izomalt (E953): 2448,3 mg/pastilă

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pastilă

Pastile rotunde, cu margini teșite și cu suprafață aspră, de culoare verde pal până la verde. Pot prezenta pete albe, culoare neuniformă, bule de aer în interiorul pastilei și margini cu neregularități mici.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicații terapeutice

Septolete total lemon & elderflower este recomandat la adulți și copii cu vârsta peste 6 ani pentru tratamentul antiinflamator, analgezic și antiseptic al inflamațiilor gâtului, cavității bucale și gingiilor, în gingivite, faringite și laringite.

4.2 Doze și mod de administrare

Doze

Adulți: Doza recomandată este de 3-4 pastile pe zi. Pastila trebuie dizolvată lent în cavitatea bucală, la interval de 3 până la 6 ore.

Vârstnici: doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

Copii și adolescenți

Copii cu vârsta peste 12 ani: Doza recomandată este de 3-4 pastile pe zi. Pastila trebuie dizolvată lent în cavitatea bucală, la interval de 3 până la 6 ore.

Copii cu vârsta de 6 până la 12 ani: Doza recomandată este de 3 pastile pe zi. Pastila trebuie dizolvată lent în cavitatea bucală, la interval de 3 până la 6 ore.

Copii cu vârsta sub 6 ani: Septolete total lemon & elderflower este contraindicat la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Pentru obținerea unui efect optim, nu se recomandă utilizarea medicamentului imediat înainte sau după periajul dentar.

Doza recomandată nu trebuie depășită.

Septotele total lemon & elderflower poate fi utilizat pentru o perioadă de până la 7 zile.

Mod de administrare

Pastila trebuie dizolvată în cavitatea bucală, la interval de 3 până la 6 ore.

4.3 Contraindicații

Hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.
Copiii cu vârsta sub 6 ani, la care această formă farmaceutică nu este indicată.

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Septotele total lemon & elderflower nu trebuie utilizat mai mult de 7 zile consecutive.
Dacă nu se observă niciun efect după 3 zile de tratament, se recomandă consult medical.

Utilizarea medicamentelor topice pentru o perioadă îndelungată poate duce la sensibilizare, caz în care tratamentul trebuie întrerupt și trebuie instituită o terapie adecvată.

Septotele total lemon & elderflower nu trebuie utilizat în asociere cu compuși anionici, cum sunt cei prezenți în pastele de dinți, prin urmare nu se recomandă utilizarea medicamentului imediat înainte sau după periajul dentar.

Septotele total lemon & elderflower conține izomalt (E953). Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Septotele total lemon & elderflower nu trebuie utilizat concomitent cu alte medicamente antiseptice.
Pastilele nu trebuie administrate împreună cu lapte, deoarece acesta reduce eficacitatea antimicrobiană a clorurii de cetilpiridiniu.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Datele sunt limitate sau inexistente privitor la utilizarea la femeile gravide a clorhidratului de benzidamină și clorurii de cetilpiridiniu. Septotele total lemon & elderflower nu este recomandat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă clorhidratul de benzidamină/metaboliții săi se excretă în laptele uman. Nu poate fi exclusă existența unui risc pentru nou-născuți/sugari. După evaluarea beneficiului alăptării pentru copil și a beneficiului tratamentului pentru mamă, trebuie luată decizia de a întrerupe alăptarea sau cea de a întrerupe/abținerea de la tratamentul cu Septotele total lemon & elderflower.

4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Septotele total lemon & elderflower nu prezintă influență sau nu afectează în mod semnificativ capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

4.8 Reacții adverse

- Foarte frecvente ($\geq 1/10$),
- Frecvente ($\geq 1/100$ și $<1/10$);
- Mai puțin frecvente ($\geq 1/1000$ și $<1/100$);
- Rare ($\geq 1/10000$ și $<1/1000$);
- Foarte rare ($<1/10000$);
- Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Lista reacțiilor adverse, sub formă de tabel

	Rare	Foarte rare	Cu frecvență necunoscută
Tulburări ale sistemului imunitar			Reacții anafilactice Reacție de hipersensibilitate
Tulburări ale sistemului nervos			Senzație de arsură la nivelul mucoasei bucale Anestezia mucoasei bucale
Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale	Bronhospasm		
Tulburări gastro- intestinale		Iritarea mucoasei bucale, senzație de arsură bucală	
Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat	Urticarie, fotosensibilitate		

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau email: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

4.9 Supradozaj

Simptome

Manifestările toxice ale supradozajului cu benzidamină constau în stare de excitație, convulsii, transpirații, ataxie, tremor și vărsături. Întrucât nu există un antidot specific, tratamentul intoxicației acute este numai simptomatic.

Semnele și simptomele intoxicației prin ingestia unor cantități semnificative de clorură de cetilpiridiniu includ greață, vărsături, dispnee, cianoză, asfixie, consecutive paraliziei mușchilor respiratori, deprimarea SNC, hipotensiune arterială și comă. Doza letală la om este de aproximativ 1-3 grame.

Tratament

Întrucât nu există un antidot specific, tratamentul intoxicației acute este numai simptomatic.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente pentru zona oro-faringiană, antiseptice; codul ATC: R02AA20.

Mecanism de acțiune

Clorhidratul de benzidamină prezintă o moleculă cu structură nesteroidiană cu proprietăți antiinflamatorii și analgezice. Mecanismul de acțiune este atribuit inhibării sintezei de prostaglandine și, consecutiv, reducerii semnelor inflamației locale (cum sunt durerea, eritemul, edemul, creșterea temperaturii și disfuncției locale).

Clorhidratul de benzidamină are și un moderat efect anestezic.

Clorura de cetilpiridiniu este un antiseptic cationic din grupul sărurilor cuaternare de amoniu.

Eficacitate și siguranță clinică

Benzidamina este utilizată în special pentru tratamentul afecțiunilor orofaringiene.

Clorura de cetilpiridiniu este activă împotriva bacteriilor Gram-pozitive și mai puțin activă împotriva bacteriilor Gram-negative, și astfel prezintă acțiune antiseptică și germicidă. Prezintă, de asemenea, proprietăți antifungice și acțiune antivirală împotriva unor virusuri încapsulate (cum ar fi virusurile gripale, virusul respirator sincițial, coronavirusurile, etc.).

Într-un studiu in vitro care a modelat condițiile fiziologice umane în cavitatea bucală, Septote total lemon & elderflower pastile a prezentat un efect virucid împotriva coronavirusului 2 (SARS-CoV-2) sindromului respirator acut sever, betacoronavirus 1 (tulpina OC-43) și orthomyxovirus (virusul gripal A, tip H3N2), prin perturbarea învelișului viral și inactivarea virusului. Septote total lemon & elderflower pastile a micșorat numărul virusurilor SARS-CoV-2 și virusul gripal A cu mai mult de 99,99% deja după 1 minut.

Într-un studiu clinic controlat cu placebo cu Septote total lemon & elderflower 3 mg/1 mg pastile debutul ameliorării durerii (reducerea durerii și inflamației faringiene) a fost observată la 15 minute după administrarea unei pastile și durata de acțiune a fost de până la 3 ore.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Absorbție

Dintre cele două substanțe active, cetilpiridiniu și benzidamină, numai benzidamina este absorbită. Prin urmare, cetilpiridiniu nu determină efecte de interacțiune farmacocinetică la nivel sistemic cu benzidamina.

Absorbția benzidaminei la nivelul mucoasei orofaringiene este demonstrată prin evidențierea unor cantități detectabile de substanță activă în ser, insuficiente, totuși, pentru producerea unor efecte sistemice.

Totuși, benzidamina este absorbită la administrare sistemică. Prin urmare, absorbția benzidaminei este mai mare la administrarea formelor farmaceutice care se dizolvă la nivel bucal, comparativ cu administrarea topică (spray bucofaringian).

Distribuție

Volumul de distribuție este același la toate formele farmaceutice.

Eliminare

Excreția are loc în principal la nivel renal și, în proporție semnificativă, sub formă de metaboliți inactivi. Timpul de înjumătățire prin eliminare și clearance-ul sistemic sunt similare în toate formele farmaceutice.

5.3 Date preclinice de siguranță

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcției de reproducere și dezvoltării.

Rezultatele unui studiu de administrare rațională a combinației celor două substanțe active au arătat că medicamentul prezintă o toleranță optimă și nu determină toxicitate. Testele de tolerabilitate la animale, efectuate cu combinația clorhidrat de benzidamină și clorură de cetilpiridiniu, au evidențiat un profil bun de tolerabilitate.

Clorhidratul de benzidamină și clorura de cetilpiridiniu, administrate în combinație, nu au determinat modificări ale florei bacteriene intestinale.

Clorhidratul de benzidamină și clorura de cetilpiridiniu, sub formă farmaceutică de pastile, au prezentat o tolerabilitate optimă la pacienți, fără să determine efecte toxice, la nivel local sau sistemic.

6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Ulei de mentă
Levomentol
Sucraloză (E955)
Acid citric (E330)
Izomalt (E953)
Aromă de citrice
Aromă de floare de soc
Curcumină (E100)
Complexe cupru clorofilină(E141)

6.2 Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

48 luni

6.4 Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C.
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină.

6.5 Natura și conținutul ambalajului

Blister (PVC/PE/PVDC//Al): cutie cu 16 pastile.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerințe speciale.

7. DETINATORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

8. NUMĂRUL(ELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

24301

9. DATA AUTORIZĂRII

26.03.2018

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

22.04.2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>